

Przedłużone stosowanie smoczka w dzieciństwie i palenie papierosów w okresie dorastania: dowody z historycznego badania kohortowego.

[Ferreira HR¹](#), [Rosa EF](#), [Antunes JL](#), [Duarte DA](#), [Imparato JC](#), [Pannuti CM](#), [Mendes FM](#). [Eur Addict Res](#). 2015;21(1):33-8. doi: 10.1159/000365351. Epub 2014 Oct 28. Prolonged pacifier use during infancy and smoking initiation in adolescence: evidence from a historical cohort study.

Streszczenie i tłum. Lek. Monika Żukowska - Rubik

Celem badania było sprawdzenie związku pomiędzy przedłużonym stosowaniem smoczka uspokajacza w dzieciństwie i paleniem papierosów w okresie dorastania i wczesnym wieku dorosłym.

Zaplanowano badanie na grupie pacjentów prywatnej kliniki stomatologicznej w Brazylii. Wykorzystano dokumentację medyczną, która zawierała pełne dane o nawykach dotyczących ssania u 314 dzieci w wieku 2-10 lat, które zgłosiły się do kliniki w latach 1988 do 1994. Następnie w latach 2004 do 2006 zebrano dane dotyczące palenia papierosów u 261 osób z tej grupy, z którymi udało się skontaktować. Punktem końcowym badania było palenie papierosów, jako palaczy zakwalifikowano te osoby, które wypaliły więcej niż 100 papierosów w życiu. Przy pomocy metod statystycznych sprawdzono związek pomiędzy nawykami oralnymi i paleniem.

Zaobserwowano istotną statystycznie zależność pomiędzy używaniem smoczka powyżej 24 miesięcy i paleniem (IRR 4,48, 95% CI 2.32-8.65). Karmienie piersią miało efekt ochronny. (IRR = 0.64; 95% CI 0.42-0.96)

Wnioski:

Przedłużone stosowanie smoczków uspokajaczy wykazuje pozytywną korelację z inicjacją palenia papierosów w okresie dorastania i wczesnej dorosłości.